

Tessaria dodoneifolia (Hook. & Arn.) Cabrera (Asteraceae)

Nombres vulgares: chilca, chilca dulce, chilca negra, chirka melola, suncho.

Arbustos con raíces gemíferas, muy ramosos, tallos erectos, hasta 3 m de alto, algo viscosos (glutinosos), estriados, hojosos (Fig. 1).

HOJAS: simples, alternas, sésiles, lanceoladas, de 4-8 cm de largo por 0,5-2 cm de ancho, agudas, dentado-aserradas en el margen, verde lustrosas, con glándulas puntiformes en ambas caras (Fig. 2).

FLORES: pequeñas, rosado-lilacinas o blancas, de unos 4 mm de largo, reunidas en pequeños capítulos dispuestos en cimas corimbiformes terminales (Fig. 3).

FRUTOS: laxamente pubescentes, con papus formado por cerdas simples o apenas escabrosas (Fig. 4).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA: especie de Bolivia, Paraguay, Uruguay y centro y norte de Argentina. Frecuente en suelos salinos, arcillosos, bajos e inundables, en peladales, bosques xerófilos degradados y palmares de las ecorregiones de las Yunga, Chaco Húmedo, Chaco Seco, Espinal y la Pampa. Florece y fructifica en primavera y verano.

USOS: con sus ramas, los tobas confeccionan asadores para pescados y armazones para mosquiteros. En medicina popular, la infusión de las hojas frescas es utilizada como antimicótico y en problemas urinarios. Las hojas son endulzantes, y sus flores tiñen de amarillo.

FLORA HALÓFILA DE ARGENTINA





Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4