

Cyclolepis genistoides Gillies ex D. Don (Asteraceae)

Nombres vulgares: palo azul, zusqui, matorro, matorro negro, monte azul, tupis, usillo.

Arbustos de hasta 2,5 m de alto (Fig. 1). Ramas espinescentes y perpendiculares a los tallos, rígidas, verde grisáceas y con estrías azuladas (Fig. 2).

HOJAS. Simples, alternas, angostamente elípticas, de 0,6-2 cm de largo y 0,2-0,6 cm de ancho, caducas (Fig 2).

FLORES. tubuloso-filiformes, de 1-1,2 cm de largo, blanco-amarillentas, todas perfectas o todas pistiladas (plantas ginodioicas), dispuestas de a 10-15 en capítulos discoideos cortamente pedunculados (Fig. 3).

FRUTOS. Cipselas cilíndricas, densamente velludas, de 3 mm de largo, papus amarillento (Fig. 4).

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA . Especie de Paraguay y Argentina. Típica de suelos salinos, erosionados, bajos e inundables de las ecorregiones de Chaco Seco, Chaco Húmedo, Espinal, Monte y Estepa Patagónica. A veces en colonias o comunidades definidas denominadas mogotales. Florece desde fines de septiembre hasta diciembre. Fructifica desde noviembre a diciembre.

USOS. En ambientes extremos las ramas jóvenes son consumidas por el ganado, por lo que es considerado arbusto forrajero. Buen recurso apícola, provee néctar y polen. En medicina popular se emplean infusiones de sus ramas para tratar las enfermedades crónicas de reumatismo, además de diurético, para eliminar el ácido úrico y colesterol. Se utiliza además como calmante de dolores renales y de huesos.

FLORA HALÓFILA DE ARGENTINA

